

دستورالعمل مصرف شربت ها در اطفال

ردیف	نام دارو	فرمول تجویز دارو	مثال	مقدار دارو در شبانه روز
۱	دکسترومتورفان	وزن تقسیم بر ۱۰ هر ۶ ساعت	(کودک ۲۰ کیلوگرمی) $20 \div 10 = 2$	هر ۶ ساعت ۲ میلی لیتر
۲	بلادونا پی بی	وزن تقسیم بر ۱۰ هر ۶ ساعت	(کودک ۲۰ کیلوگرمی) $20 \div 10 = 2$	هر ۶ ساعت ۲ میلی لیتر
۳	اکسپکتورانت	وزن تقسیم بر ۶ هر ۸ ساعت	کودک ۳۰ کیلوگرمی $30 \div 6 = 5$	هر ۸ ساعت ۵ میلی لیتر
۴	پرومتازین	وزن تقسیم بر ۱۰ هر ۶ ساعت	(کودک ۲۰ کیلوگرمی) $20 \div 10 = 2$	هر ۶ ساعت ۲ میلی لیتر
۵	فروس سولفات	وزن تقسیم بر ۵ هر ۲۴ ساعت	(کودک ۲۰ کیلوگرمی) $20 \div 5 = 4$	هر ۲۴ ساعت ۴ میلی لیتر
۶	مترونیدازول برای ژیاوردیا	وزن تقسیم بر ۵ هر ۲۴ ساعت	(کودک ۲۰ کیلوگرمی) $20 \div 5 = 4$	هر ۲۴ ساعت ۴ میلی لیتر
۷	سولفات روی ۱٪	وزن تقسیم بر ۲ هر ۱۲ ساعت	(کودک ۲۰ کیلوگرمی) $20 \div 2 = 10$	هر ۱۲ ساعت ۱۰ میلی لیتر
۸	آموکسی سیلین ۱۲۵ میلیگرم در ۵ میلی لیتر	وزن ضربدر دو سوم هر ۸ ساعت	(کودک ۱۵ کیلوگرمی) $15 \times \frac{2}{3} = 10$	هر ۸ ساعت ۱۰ میلی لیتر
۹	آمپی سیلین ۱۲۵ میلیگرم در ۵ میلی لیتر	وزن تقسیم بر ۲ هر ۶ ساعت	(کودک ۲۰ کیلوگرمی) $20 \div 2 = 10$	هر ۶ ساعت ۱۰ میلی لیتر
۱۰	سفالکسین ۱۲۵ میلیگرم در ۵ میلی لیتر	وزن تقسیم بر ۲ هر ۶ ساعت	(کودک ۲۰ کیلوگرمی) $20 \div 2 = 10$	هر ۶ ساعت ۱۰ میلی لیتر
۱۱	پنی سیلین ۲۵۱۷ میلیگرم در ۵ میلی لیتر	وزن تقسیم بر ۲ هر ۶ ساعت	(کودک ۲۰ کیلوگرمی) $20 \div 2 = 10$	هر ۶ ساعت ۱۰ میلی لیتر
۱۲	استامینوفن	وزن تقسیم بر ۲ هر ۴ ساعت	(کودک ۲۰ کیلوگرمی) $20 \div 2 = 10$	هر ۴ ساعت ۱۰ میلی لیتر
۱۳	دیفن هیدرامین	وزن تقسیم بر ۲ هر ۶ ساعت	(کودک ۲۰ کیلوگرمی) $20 \div 2 = 10$	هر ۶ ساعت ۱۰ میلی لیتر
۱۴	دیفن هیدرامین کامپاند	وزن تقسیم بر ۲ هر ۶ ساعت	(کودک ۲۰ کیلوگرمی) $20 \div 2 = 10$	هر ۶ ساعت ۱۰ میلی لیتر
۱۵	فورازولیدون	وزن تقسیم بر ۲ هر ۶ ساعت	(کودک ۲۰ کیلوگرمی) $20 \div 2 = 10$	هر ۶ ساعت ۱۰ میلی لیتر

دستور العمل مصرف شربت ها در اطفال

ردیف	نام دارو	فرمول تجویز دارو	مثال	مقدار دارو در شبانه روز
۱۶	آموکسی سیلین ۲۵۰ میلیگرم در ۵ میلی لیتر	وزن تقسیم بر سه هر ۸ ساعت	(کودک ۳۰ کیلوگرمی) $30 \div 3 = 10$	هر ۸ ساعت ۱۰ میلی لیتر
۱۷	آمپی سیلین ۲۵۰ میلیگرم در ۵ میلی لیتر	وزن تقسیم بر ۴ هر ۶ ساعت	(کودک ۲۰ کیلوگرمی) $20 \div 4 = 5$	هر ۶ ساعت ۵ میلی لیتر
۱۸	سفا لکسین ۲۵۰ میلیگرم در ۵ میلی لیتر	وزن تقسیم بر ۴ هر ۶ ساعت	(کودک ۲۰ کیلوگرمی) $20 \div 4 = 5$	هر ۶ ساعت ۵ میلی لیتر
۱۹	اریترومایسین ۲۰۰ میلیگرم در ۵ میلی لیتر	وزن تقسیم بر ۴ هر ۶ ساعت	(کودک ۲۰ کیلوگرمی) $20 \div 4 = 5$	هر ۶ ساعت ۵ میلی لیتر
۲۰	کوتریموکسازول	وزن تقسیم بر ۲ هر ۱۲ ساعت	(کودک ۲۰ کیلوگرمی) $20 \div 2 = 10$	هر ۱۲ ساعت ۱۰ میلی لیتر
۲۱	ینی سیلین ۲۵۰۷ میلی گرم در ۵ میلی لیتر	وزن تقسیم بر ۴ هر ۶ ساعت	(کودک ۲۰ کیلوگرمی) $20 \div 4 = 5$	هر ۶ ساعت ۵ میلی لیتر
۲۲	سرماخوردگی کودک	وزن تقسیم بر سه هر ۸ ساعت	(کودک ۳۰ کیلوگرمی) $30 \div 3 = 10$	هر ۸ ساعت ۱۰ میلی لیتر
۲۳	سالبوتامول	وزن تقسیم بر سه هر ۸ ساعت	(کودک ۳۰ کیلوگرمی) $30 \div 3 = 10$	هر ۸ ساعت ۱۰ میلی لیتر
۲۴	دی سیکلومین	وزن تقسیم بر سه هر ۸ ساعت	(کودک ۳۰ کیلوگرمی) $30 \div 3 = 10$	هر ۸ ساعت ۱۰ میلی لیتر
۲۵	تئوفیلین جی	وزن تقسیم بر سه هر ۸ ساعت	(کودک ۳۰ کیلوگرمی) $30 \div 3 = 10$	هر ۸ ساعت ۱۰ میلی لیتر
۲۶	هیدروکسی زین	وزن تقسیم بر ۴ هر ۶ ساعت	(کودک ۲۰ کیلوگرمی) $20 \div 4 = 5$	هر ۶ ساعت ۵ میلی لیتر
		وزن تقسیم بر سه هر ۸ ساعت	(کودک ۳۰ کیلوگرمی) $30 \div 3 = 10$	هر ۸ ساعت ۱۰ میلی لیتر
		وزن تقسیم بر ۲ هر ۱۲ ساعت	(کودک ۲۰ کیلوگرمی) $20 \div 2 = 10$	هر ۱۲ ساعت ۱۰ میلی لیتر
۲۷	پسودوافدرین	معادل وزن هر ۲۴ ساعت	(کودک ۲۰ کیلوگرمی)	هر ۲۴ ساعت ۲۰ میلی لیتر
۲۸	ایبوپروفن	وزن تقسیم بر ۴ هر ۶ ساعت	(کودک ۲۰ کیلوگرمی) $20 \div 4 = 5$	هر ۶ ساعت ۵ میلی لیتر
۲۸	ایبوپروفن	وزن تقسیم بر سه هر ۸ ساعت	(کودک ۳۰ کیلوگرمی) $30 \div 3 = 10$	هر ۸ ساعت ۱۰ میلی لیتر

دستورالعمل مصرف شربت ها در اطفال

مقدار دارو در شبانه روز	مثال	فرمول تجویز دارو	نام دارو	ردیف
هر ۶ ساعت ۵ میلی لیتر	(کودک ۲۰ کیلوگرمی) $20 \div 4 = 5$	وزن تقسیم بر ۴ هر ۶ ساعت	نیتروفورانتوئین	۲۹
هر ۶ ساعت ۵ میلی لیتر	(کودک ۲۰ کیلوگرمی) $20 \div 4 = 5$	وزن تقسیم بر ۴ هر ۶ ساعت	برم هگزین	۳۰
هر ۸ ساعت ۱۰ میلی لیتر	(کودک ۳۰ کیلوگرمی) $30 \div 3 = 10$	وزن تقسیم بر سه هر ۸ ساعت		
هر ۱۲ ساعت ۱۰ میلی لیتر	(کودک ۲۰ کیلوگرمی) $20 \div 2 = 10$	وزن تقسیم بر ۲ هر ۱۲ ساعت		
هر ۶ ساعت ۵ میلی لیتر	(کودک ۲۰ کیلوگرمی) $20 \div 4 = 5$	وزن تقسیم بر ۴ هر ۶ ساعت	نالید یکسیک اسید	۳۱